

Afta-juventus

colutorio



TRATAMIENTO LOCAL DE LAS AFTAS Y ULCERACIONES DE LA MUCOSA BUCAL

COMPOSICIÓN: Hidrocortisona hemisuccinato (D.C.I.): 60 mg, Cloruro de benzalconio (D.C.I.): 3 mg, Excipiente: glicerina, c.s.p: 30 ml.

INDICACIONES: Aftas. Estomatitis infecciosa. Estomatitis catarral. Muguet.

POSOLOGÍA: 2 ó 3 toques al día sobre la zona afectada, haciendo uso de la varilla-espátula (siempre de acuerdo con la prescripción facultativa).

NORMAS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN: Después de cada utilización y antes de introducir la varilla-espátula en el frasco para tomar líquido nuevamente, es conveniente limpiar ésta con un algodón impregnado en alcohol.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: No debe prolongarse el tratamiento durante largos períodos de tiempo ni en afecciones de tipo herpético.

INCOMPATIBILIDADES: No presenta incompatibilidades.

INTERACCIONES: No se han descrito interacciones en el uso tópico de esta formulación.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Su aplicación prolongada durante semanas puede producir síntomas de hipercorticismos, que desaparecen al suspender su administración. Debe comunicar a su médico o a su farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita en el prospecto.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: La ingestión de un envase no produce efectos tóxicos, aunque debe consultarse al médico para instaurar la terapia más conveniente en función de la edad y estado del paciente. En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN Y PRECIO:

Frasco con aplicador, conteniendo 30 ml.
P.V.P. IVA. 3,54 €. C. N. 702068.

Con receta médica.

Excluido de la financiación por el S.N.S.

LABORATORIOS ERN, S.A

Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona, España.



Si desea obtener más información sobre **Afta-juventus** contacte con **Laboratorios ERN, S.A.** mediante un correo electrónico a info@ern.es