

EFEDRINA LEVEL
Efedrina clorhidrato

COMPOSICIÓN

Por comprimido:

Efedrina clorhidrato..... 50 mg

Excipientes: celulosa microcristalina, talco, estearato magnésico y carboximetilalmidón sódico.

INDICACIONES

Asma bronquial, fiebre del heno(coriza de los henos).

Tratamiento coadyuvante de: jaquecas, urticarias, eczemas, neurodermitis, edema de Quinke, etc. Espasmo bronquial en ataques agudos de asma bronquial, bronquitis espástica, enfisema pulmonar, status asmaticus y asma crónica severa.

POSOLOGÍA

La dosis usual salvo prescripción facultativa es de 1 comprimido 2-3 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Trombosis coronaria, hipertensión, tirotoxicosis. Pacientes alérgicos a la efedrina.

PRECAUCIONES

Debe administrarse con mucha precaución en: Enfermedad cardíaca orgánica, descompensación cardíaca o angina de pecho e hipertrofia prostática.

INCOMPATIBILIDADES

Inhibidores de la M.A.O. incluso dentro de las dos semanas después de haber finalizado el tratamiento con estas drogas.

Glucósidos digitálicos.

INTERACCIONES

Clorbutol, yodo, sales de plata y ácido tánico.

ADVERTENCIA

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control de dopaje como positivo.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Trastornos nerviosos tales como: ansiedad, insomnio, cefaleas y mareos.

Trastornos musculares tales como: temblores y debilidad muscular.

Trastornos cardiovasculares tales como: taquicardia, palpitaciones, dolor precordial y palidez, especialmente en pacientes hipersensibles como ocurre con los neuróticos e hipertiroideos.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

El insomnio y demás efectos estimulantes de la efedrina sobre el sistema nervioso central pueden ser contrarrestados por la administración de hipnóticos.

En caso de intoxicación severa, el estómago debe ser inmediatamente vaciado por aspiración y lavado. Para controlar la excitación pueden administrarse sedantes como la clorpromacina a dosis de 50 o 100 mg por vía intramuscular o un barbitúrico. Para controlar la taquicardia, puede administrarse propanolol a dosis de 2,5 – 5 mg por vía intravenosa, o practolol en pacientes asmáticos. La eliminación de la efedrina debe ser ayudada acidificando la orina con cloruro amónico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Envase con 24 comprimidos.

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios ERN, S.A. Pedro IV, 499. 08020 Barcelona. España.

RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN

Laboratorios ERN, S.A. Gorcs i Lladó, 188. 08210 – Barberá del Vallés, Barcelona. España.

Laboratorios ERN, S.A. Perú, 228 – 08020 Barcelona. España.