

LEVELINA POLVO PARA USO CUTÁNEO (Bifonazol)

COMPOSICIÓN (por 100 g):

Bifonazol (D.C.I.). 1 g

Excipientes: Sílice coloidal, óxido de zinc y talco, c.s.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

LEVELINA, POLVO, frasco con 20 g al 1%

ACTIVIDAD:

LEVELINA (Bifonazol) es un antimicótico de amplio espectro de acción que abarca dermatofitos, levaduras, mohos y otros micetos, como *Malassezia furfur*; además es eficaz contra *Corynebacterium minutissimum*.

La acción sobre dermatofitos (por ej.: *Trichophyton* spp.) es fundamentalmente fungicida *in vitro*, y sobre levaduras, fuertemente fungistática.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios ERN, S.A. Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España.

RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN

Laboratorios ERN, S.A. Gorcs i LLadó, 188 – 08210 Barberá del Vallés, Barcelona. España.

Laboratorios ERN, S.A. Perú, 228 – 08020 Barcelona. España.

INDICACIONES

Micosis de la piel causadas por dermatofitos, levaduras, mohos y otros micetos, como *Malassezia furfur* y también infecciones por *Corynebacterium minutissimum*. Estos pueden ser, por ej.: Micosis de los pies y manos (Tiña de los pies y de las manos), Micosis del cuerpo y pliegues cutáneos (Tiña del cuerpo, Tiña inguinal), Pitiriasis versicolor, así como Eritrasma y Balanitis por *Cándida*.

LEVELINA (Bifonazol) polvo tiene la propiedad de absorber, en las micosis exudativas, la humedad de la piel y pliegues cutáneos, lo que tiene importancia en la tiña de los pies y en las micosis intertriginosas cutáneas.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al bifonazol.

INCOMPATIBILIDADES:

No se han descrito

POSOLÓGIA:

Para el apoyo higiénico de la terapéutica local, es recomendable, antes de la aplicación, lavar y secar cuidadosamente las zonas cutáneas afectadas.

Para obtener una acción duradera, no debería interrumpirse el tratamiento con LEVELINA (Bifonazol), tras la desaparición de los síntomas agudos inflamatorios o molestias subjetivas, sino que, según el tipo de micosis, debería realizarse durante los periodos indicados a continuación:

LEVELINA (Bifonazol) polvo se emplea espolvoreando las zonas, 1 vez al día, durante 2-4 semanas.

SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO:

Dada la concentración del principio activo y la forma de administración, la intoxicación no es posible ni en el caso de una ingestión accidental.

REACCIONES ADVERSAS

En raros casos pueden aparecer reacciones cutáneas leves.

Debe comunicar a su médico o a su farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita en el prospecto.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

CON RECETA MÉDICA