

MAGIÓN Magaldrato

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:

Magaldrato (D.C.I) 450 mg

Excipientes: Manitol, carboximetilalmidón de sodio (tipo A), mentol, sílice coloidal anhidra, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, talco y sacarina sódica.

PROPIEDADES

MAGIÓN contiene magaldrato como único principio activo.

El magaldrato es una molécula compleja constituida por retículos mixtos de hidróxido de magnesio-aluminio. Esta estructura confiere al magaldrato las siguientes características: Gran capacidad de neutralización de la hiperacididez, cualquiera que sea la cantidad de ácido; normalización prolongada del pH gástrico entre 3 y 5, valores entre los que no se produce el efecto de rebote ácido; elevada capacidad de fijación de los ácidos biliares y lisolecitina, con la consiguiente inactivación del reflujo duodenogástrico y protección de la mucosa.

Magión tiene contenido muy bajo en sodio (0,01 mEq o 0,22 mg por comprimido), por lo que puede ser administrado a pacientes hipertensos.

INDICACIONES

Hiperclorhidria y ardor de estómago. Gastritis y esofagitis péptica. Tratamiento sintomático de la acidez asociada a úlcera péptica. Hernia de hiato.

DOSIFICACIÓN

Salvo prescripción facultativa:

De 1 a 2 comprimidos, preferentemente 1 ó 2 horas después de las comidas y antes de acostarse. Estas dosis pueden aumentarse en casos de úlcera gastroduodenal hasta 20 comprimidos al día.

NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Los comprimidos de MAGIÓN se pueden tragar, desleir fácilmente en la boca, o bien masticar.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal grave.

ADVERTENCIA

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

En madres lactantes consulte a su médico.

INTERACCIONES

Reduce la absorción de tetraciclinas, isoniazida, digoxina, fenitoína, sales de hierro y vitaminas, por lo que la ingestión de MAGIÓN deberá espaciarse 2 horas respecto de la de dichos fármacos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Diarrea o estreñimiento. Los tratamientos prolongados pueden producir hiponatremia, hipopotasemia e hipofosfatemia.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

MAGIÓN es prácticamente atóxico. Debido a la insolubilidad del antiácido, el exceso que no reaccione con el ácido clorhídrico gástrico, no se absorberá, eliminándose inalterado.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 5620420.

PRESENTACIÓN

Envase con 40 comprimidos.

SIN RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios ERN, S.A. Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España.

RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN

Laboratorios ERN, S.A. Gorgs Lladó, 188. 08210 – Barberá del Vallés, Barcelona. España.

Laboratorios ERN, S.A. Perú, 228 – 08020 Barcelona. España.